

Indikation/Therapie/Population	Empfohlene Impfungen
Transplantation solider Organe [1]	
Vor Transplantation solider Organe	Pneumokokken
	Hepatitis B
	Influenza (inaktivierte Impfung) ³
Nach Transplantation solider Organe Alle inaktivierten Standardimpfungen frühestens 2 - 6 Mo nach SOT (nach initialer Hochdosis-Immunsuppression)	Influenza (inaktivierte Impfung)
	Cave: Keine Lebendimpfungen zu keinem Zeitpunkt nach SOT Ausnahme: Varizellen-Impfung bei Kindern nach Leber -oder Nierentransplantation
Hämatopoetische Stammzelltransplantation (SZT)	
VOR SZT	gemäß den Empfehlungen des Österreichischen Impfplans lebenslang jährliche Influenzaimpfung
NACH SZT	konjugierte Pneumokokkenimpfung (4. Dosis mit PPV23 12 Monate nach SZT; bei GvHD 4. Dosis mit PNC13 statt PPV23)
	Haemophilus influenzae B (Hib) frühestens nach 6 Monaten
	Diphtherie/Tetanus/Pertussis mit hohem (DTaP) Antigen - Gehalt
	Hepatitis B
	Masern/Mumps/Röteln im Fall einer Masern-Seronegativität (24 Monate nach SZT) Varizellen (24 Monate nach SZT)